

Smartertalents von Smarter Medicin

Stumpfe Verletzungen

Umgang mit systematischen und topischen
NSAR auf dem KJNO


Jessica Illi

21. November 2025



herzlich, kompetent, vernetzt

Erste Ideen



Altersgruppe	Maximale Anzahl Pflaster	Einwirkdauer	Wirkungsdauer nach Entfernung
Neugeborene (0-2 Monate)	1 Pflaster	max. 1 Stunde	ca. 1 Stunde
Säuglinge (3-11 Monate)	bis zu 2 Pflaster	ca. 1 Stunde	ca. 1-2 Stunden
Kinder (1-5 Jahre)	bis zu 10 Pflaster	1-5 Stunden	ca. 1-2 Stunden
Kinder (6-11 Jahre)	bis zu 20 Pflaster	1-5 Stunden	ca. 1-2 Stunden
Kinder mit atopischer Dermatitis	individuell	max. 30 Minuten	kürzer als üblich

Presented with xmind

Projektbeschreibung

■ Ziel nach SMART:

Bis *** 2026 wird auf dem Kinder- und Jugendnotfall Luzern der Voltaren-Salbenverband bei stumpfen Verletzungen abgeschafft. Stattdessen wird die PEACE & LOVE-Methode durch ein neu entwickeltes Informationsblatt eingeführt und vom Pflegepersonal in mindestens 80 % der Fälle angewendet.

■ Projektfragestellung:

Wie kann durch die Einführung der PEACE & LOVE-Methode und eines Informationsblatts zur Elternaufklärung der Einsatz von Low-Value-Care (Voltaren-Salbenverband) reduziert werden?

Zerlegt nach SMART:

Kriterium	Umsetzung in deinem Projekt
Spezifisch	Abschaffung der Voltaren-Salbenverbände, Einführung elternorientierter Aufklärung nach PEACE & LOVE
Messbar	80 % des Teams wenden die neue Methode an + Elternaufklärung wird dokumentiert
Attraktiv	fördert evidenzbasierte Pflege, stärkt Elternkompetenz, reduziert unnötige Interventionen
Realistisch	Informationsblatt, interne Schulung, klare Kommunikation umsetzbar
Terminiert	Umsetzung bis Ende April 2026 (je nach Projektzeitraum anpassbar)

■ Teilziele:

1. Literaturrecherche zu Low-Value-Care, Voltaren-Gel und PEACE & LOVE-Methode durchführen und zusammenfassen.
2. Informationsblatt für Eltern zur evidenzbasierten Versorgung bei stumpfen Verletzungen (nach PEACE & LOVE) entwickeln.
3. Pflegepersonal schulen (z. B. in einer kurzen internen Weiterbildung oder Infomail).
4. Pilotphase starten: Anwendung der neuen Methode über einen definierten Zeitraum (z. B. 2 Monate).
5. Evaluation: Überprüfen, ob der Voltaren-Salbenverband nicht mehr angewendet wird und wie viele Mitarbeitende das Infoblatt nutzen.



Schwierigkeiten

- Themenwahl
- Allgemeine Studienlage Pädiatrie
- Interpretieren von Studien
- Erwartung --> Studien --> Output
- Informationen vom ST-Team

Warum ist das Thema Wichtig?

- Unterschiedliche Handhabungen
- Verschiedene Informationen

Was ist mir gelungen?

- Ansprechendes Merkblatt im gleichen Style
- "Missverständnis" aufdecken
- Gleiche Informationen von jeder PFP/Ärzteteam
- Zusammenarbeit mit OA



Ausblick & To Do

- Infoblatt drucken
- Team informieren



